

Rabenhorst Bryothecae europaeae

Fasc. 1—24.



Received with the postcard at
marked by red cross

INDEX

in

Rabenhorst Bryothecae europaeae

Fasc. 1—24.

No. 1—1200.

Dresden 1872.

Druck von C. Heinrich.

Ac

Ar

Ar

1-

A

A

A

A

Index

in Rabenhorst Bryothecae europaeae

No. 1—1200.

Acaulon C. Müll.

- muticum (Schreb.) — 151. Arnstadt in Thüringen: Lucas; Weissenfels: Schliephacke.
- triquetrum (Spruce) — 164. Baden: Bausch.

Amblyodon P. B.

- dealbatus Dicks. — 99. Mecklenburg: Wüstnei.
- — — 438. Ost-Preussen: v. Klinggräff.

Amblystegium Schpr.

- confervoides (Brid.) — 639. Baiern: Fr. Arnold.
- — — 774. Wetzlar: Graf R. zu Solms-Laubach.
- fluviatile (Sw.) — 1094. England: Hunt.
- irriguum (Wils.) — 776. Böhmen: Pf. Karl.
- — fallax (Brid.) — 342. Salzburg: Sauter.
- Juratzkanum Schpr. — 640. Wien: Juratzka.
- Koehii (Bruch) — 894. Preussen: v. Klinggräff.
- — f. laxa. — 895. Böhmen: Pf. Karl.
- radicale (P. B.) — 641. Bonn: P. Dreesen.
- riparium (L.) — 482. Baden: A. Geheeb.
- — v. longifolium Schpr. — 1095. Münster: Wienkamp.
- — v. subsecundum (B. E.) — 483. z. Th. mit Hypnum palustre. Carpathen: Kalchbrenner.
- serpens (L.) — 136. Neumark: Laseh; Böhmen: Pf. Karl.
- — f. parva. — 777. Irland: D. Moore.
- — f. cryptarum — 841. Ober-Franken: Fr. Arnold.
- Sprucei (Bruch) — 348. Ober-Franken: Fr. Arnold.
- subtile (Hedw.) — 135. Oberbaiern: Bauseh.
- — — 775. Schweiz: Hepp.

Amphoridium Schpr.

- lapponicum (Hedw.) — 522. Norwegen: Th. Jensen.
- Mougeotii (Bruch) — 523. Norwegen: Th. Jensen.
- — — 665. Mont d'or in der Auvergne: S. de Laeroix, patr.

Anacalypta Röhl.

- caespitosa (Bruch) — 23. Zweibrücken: Gumbel.
- lanceolata (Dicks.) — 252. Breslau: Milde; Ober-Oestreich: Poetsch; Dresden: C. A. Hantzsch.
- latifolia (Schwaegr.) — 56. Norwegen: Graf R. zu Solms-Laubach.
- — — 611. Kärnten: Jack.
- Starkeana (Hedw.) — 251. Schlesien: Milde.
- — — 831. England: W. Curnow.

Anacamptodon Brid.

- splachnoides (Fröl.) — 165. Schwäb. Hall: Pf. Kemmler.

Andreaea Ehrh.

- alpina Turn. — 851. Irland: D. Moore.
- — — 1154. Norwegen: Kiaer.

Andreaea Ehrh.

- Blyttii Schpr. — 501. Norwegen: Th. Jensen.
- — — 953. Lappland: A^ongström.
- crassinervia Bruch. — 53. Schweiz: Hepp.
- Hartmani Thed. — 605. Lappland: S. O. Lindberg.
- nivalis Hook. — 259. Norwegen: Th. Jensen.
- petrophila Ehrh. — 51. Riesengebirge: Göppert.
- — acuminata Schpr. — 369. Norwegen: Th. Jensen.
- rupestris (L.) — 557. Westphalen: H. Müller.
- — — 604. Achern: Jack.

A^ongströmia Br. et Sch.

- longipes (Sommf.) — 157. Salzburg: Schwartz

Anodus Br. et Sch.

- Donianus (E. B.) — 107. Thüringen: Schliephacke; Franken: Fr. Arnold.

Anoetangium Schwaegr.

- compactum (Schl.) — 123. Norwegen: Th. Jensen.
- Hornschuchianum (Funk.) — 683. Kärnten: Laurer und Holler.

Anomobryum Schpr.

- julaceum Schpr. — 363. Prov. Biella: V. de Cesati.
- — — 974. Tyrol: Milde et J. Borsig.

Anomodon Hook. et Tayl.

- apiculatus Br. et Sch. — 1137. Rhöngengebirge: Geheeb.
- attenuatus (Schreb.) — 334. Vogesen: Schimper.
- longifolius (Schl.) — 474. — 1138. Salem: Jack.
- — — 1036. Schlesien: Milde.
- rostratus (Hedw.) — 636. München: Molendo.
- viticulosus (L.) — 333. Sachsen: L. R.; Coburg: A. Geheeb.
- tristis Sulliv. — 922. Genua: de Notaris.

Antitrichia Brid.

- eurtipendula (L.) pl. ♂. — 289. Schwäb. Hall: Pf. Kemmler.
- — pl. ♀. — 289. Geroldsau: Bauseh.

Archidium Brid.

- alternifolium (Dicks.) — 402. Bonn: P. Dreesen.

Astomum Hampe.

- A. rostellatum (Brid.) Schpr. — 162. Breslau: Milde.

Atrichum P. B.

- angustatum (Brid.) — 281. Baden: A. Braun.
- laxifolium Sull. — 893. England: W. Ph. Schimper.
- tenellem Röhl. — 283. Nieder-Lausitz: Baenitz.
- — — 1135. Saargebiet: F. Winter.

Atrichum P. B.

- undulatum (L.) — 113. Dresden: C. A. Hantzsch; Braunschweig: Bertram.
- — var. abbreviatum Br. E. — 282. Carpathen: C. Kalebrenner.

Aulacomnium Schwaegr.

- androgynum (L.) — 534. Baden: Bausch.
- — — 1025 Neu-Mark: Ruthe.
- palustre (L.) — 101. Böhmen: Pf. Karl; Niederlausitz: Holla.
- — polycephalum Sch. — 245. Württemberg: Pf. Kemmler.

Barbula Hedw. cf. Tortula.

- aciphylla Bruch et Schpr. — 227. Ober-Baiern: Fr. Arnold.
- aloides (Koch). — 786. Saarbrück: F. Winter.
- alpina Br. et Schpr. — 230. Pinzgau: Sauter.
- — — 460. Südtirol: Milde.
- inermis Milde — 820. Lombard: Holler.
- ambigua Br. et Schpr. — 226. Heidelberg: Fr. Arnold; Thüringen: Schliephacke.
- — — 320. Strassburg: W. Ph. Schimper.
- — — 419. Dublin: Moore.
- Brebissonii Brid. — 980. Falaise: De Brébisson.
- brevirostris Schpr. — 981. Christiania: Kiaer.
- caespitosa Schw. — 1068. Cannes, Südfrankreich: Metzler, und 1124 ab eod. = B. inclinata.
- 3. — canescens Bruch. — 526. Bonn: P. Dreesen.
- — — 788. Südtirol: Milde. XXII. 788b. Freiburg i. Br.: Sauerbeck.
- chloronotos sub 672 = B. membranifolia! Frankreich: Paris.
- concava Schpr. — 819. Oestreich: Juratzka.
- convoluta Hedw. — 229. Chur: Killias; b. Riesengebirge: Milde.
- — — 323. Dublin: Dr. Moore.
- cuneifolia Dieks. — 821. England: W. Curnow.
- — — 1072. Neapel: Kiaer; Preuss. Neumark: R. Ruthe.
- Drummondi Mitt. — 789. Jütland et Bornholm: Th. Jensen.
- fallax Hedw. — 228. Ober-Oestreich: Poetsch; Thüringen: Schliephacke; Württemberg: Pf. Kemmler.
- — var. brevifolia Schpr. — 1174. Neumark: R. Ruthe.
- flavipes Br. et Schpr. — 624. München: Molendo.
- — — 790. Eichstätt Bavariae: Fr. Arnold.
- gracilis Schw. — 669. Strassburg: Paris.
- — viridis Br. et Schpr. — 818. Hyères Galliae: W. Ph. Schimper.
- Hornschuehiana Sehtz. — 671. Strassburg: Paris.
- inclinata Schw. — 421. Sabaudia: Paris.
- inermis (Bruch) — 223. Triest: v. Tommasini.
- — — 456. Südtirol: Milde.
- — — 1125. Nizza: Metzler.
- insidiosa Jur. — 1067. Unter-Oestreich: Juratzka.
- intermedia vide sub Tortula.
- — Wils. — 1016. b. Bonn: Fürth.
- — var. brevifolia. — 1069. Baiern: Arnold.
- latifolia Bruch. — 418. Breslau: Milde; b. Irland: D. Moore.
- laevipila Brid. — 322. Baden: Bausch.
- — — 822. Penzance England: W. Curnow.

Barbula Hedw. cf. Tortula.

- marginata Br. et Sch. — 1015. Limburg Holland: van der Sande Lacoste.
- membranifolia Hook. — 321. Montreux: W. Ph. Schimper.
- — — 417. Genua: Baglietto.
- — — 1123. Nizza: Metzler.
- mucronifolia Schw. — 527. Sabaudia: Paris.
- Mülleri Bruch sub 326.
- muralis (L.) — 231. Schlesien: Hilse; Sachsen: L. R.
- — aestiva Brid. — 459. Salzburg: Sauter.
- — ineana Br. et Sch. — 565 et 566. Schweiz: Hepp; Sabaudia: Paris.
- — minor. — 232. Constanz (Baden): Leiner.
- — rupestris Sehlz. — 567 et 666. England: W. Curnow; Strassburg: Paris.
- pagorum Milde. — 458. Tyrol: Milde.
- paludosa Schwaegr. — 34. Salzburg: Sauter.
- — Funkiana Br. et Sch. — 528. Salzburg: Sauter.
- papillosa Wils. — 455. Thüringen: A. Röse.
- — — 785. Schweden: Lindberg; Jütland: Jensen.
- — — 919. Schottland: W. Ph. Schimper.
- pulvinata Juratzka — 670. Wien: Juratzka; et 787. Saarbrück: Fr. Winter.
- — — 1121. Bärwalde: Ruthe.
- — v. longifolia Jur. — 1122. Ober-Oestreich: Poetsch.
- recurvifolia Schpr. — 324. Baiern: Fr. Arnold.
- revoluta Schwaegr. — 422. Sabaudia: Paris
- rigida Sehlz. — 325. Baiern: Fr. Arnold; Irland: Moore.
- — — 979. Oberbaden: Jack; Tyrol: Graf Solms.
- — — 1173. Wien: J. Juratzka.
- Romana C. Müll sub 980.
- ruralis (L.) — 225. Oestr. Schlesien: Bernhard; Neumark: Lasch.
- — rupestris Br. et Schpr. sub 1016
- — — 1070. Elsass: C. Schimper.
- squarrosa De Ntris. — 457. Tyrol: Milde.
- subulata (L.) — 224. Oestr. Schlesien: Bernhard; Schlesien: Hilse.
- tortuosa (L.) — 35. Riesengebirge: Milde.
- unguiculata Hedw. — 420. Lichtenberg a. Rhön: Mathilde Rauschenberg.
- vinealis Brid. — 668. Frankreich: Paris.
- — — 1071. Rom: Kiaer.
- — — 784. Oberfranken: Fr. Arnold.
- — flaccida Br. et Schpr. — 982. Saarbrück: Ferd Winter.
- viridis Schpr. — 818. Hyères: W. Ph. Schimper.

Bartramia Hedw.

- Halleriana Hedw. — 235. Norwegen: Th. Jensen. Schlesien: Goeppert.
- — — 740. Tatra: C. Kalebrenner.
- ithyphylla Brid. — 234. Oestr. Schlesien: Bernhard.
- Oederi (Gunn.) — Oberbaiern: Bausch; Carpathen: Kalebrenner.
- — — 368. Norwegen: Th. Jensen.
- pomiformis (L.) — 174. Oestr. Schlesien: Bernhard; Mecklenburg: Wüstnei.
- — crispa Br. et Sch. — 175. Thüringen: Schliephacke; Sachsen: L. R.

Bartramia Hedw.

- rigida de Ntris. vide sub No. 1018.
- stricta Brid. — 739. Liguria: A. Piccone.
- subulata Br. et Schpr. — 173. Ober-Pinzgau: Schwartz.

Blindia Br. et Sch.

- acuta (Dicks.) — 31. Schlesien: Milde.
- — — 606. Rhaet. Alpen: Killias.

Brachyodus Hoppe et H.

- trichodes (W. et M.) — 454. a) Sachsen: Rostock.
- — — 454. b) Carpathen: Kalchbrenner.
- — — 1103. Traunstein Oberbaiern: Dr. Progel.

Brachythecium Schpr.

- albicans (Neck.) — 699. Mecklenburg: Brinkmann.
- campestre Br. et Schpr. — 1038. Preuss. Neumark: Ruthe.
- cirrhosum (Schwaegr.) — 911. Rhaet. Alpen: Pfeffer.
- Geheebii Milde. — 1192. Rhöngebirge: A. Geheeb.
- glareosum Br. et Schpr. — 189. Schweiz: Killias.
- laetum (Brid.) — 544. a. Baiern: Fr. Arnold; b.: Holler.
- — — 1042. Schlesien: Milde.
- Mildeanum Schpr. — 597. Westphalen: H. Müller.
- — — 747. Marienwerder: v. Klinggräff.
- — — 1037. Neumark in Preussen: Ruthe.
- plumosum (Sw.) — 449. Baden: Bausch.
- — — 485. Sachsen: L. R.
- — — 1040. England: W. Curnow.
- populeum (Hedw.) — 773. Schweiz: Geheeb.
- — — 1041. England: W. Curnow.
- — subfalcatum Schpr. — 700. Meckl.-Schwerin: Brinkmann:
- reflexum (W. et M.) — 450. Sachsen: Rostock.
- rivulare Br. et Schpr. — 188. Salzburg: Schwartz.
- — — 746. Salzburg: Sauter.
- rutabulum (L.) — 387. Sachsen: L. R.; b) Greifswald: Laurer.
- salebrosum (Hoffm.) — 350. Oberösterreich: Poetsch.
- — — 772. Urach: Kemmler.
- densum Jur. — 995. Niederösterreich: Juratzka.
- Starkii (Brid.) — 15. Pinzgau: Schwartz.
- — — 1188. Rhöngebirge: A. Geheeb.
- — — f. major. — 1039. Bärwalde (Preussen): Ruthe.
- trachypodium (Brid.) — 633. Tauernkogel und Venediger: Molendo und Lorentz.
- velutinum (Dill.) — 187. Manche Rasen gemischt mit Amblyst. serpens, andere mit Pylaisia polyantha.

Braunia Br. et Schpr.

- sciuroides (De Ntris) — 186. Genua: De Notaris.
- — — 509. Südtirol: Milde.

Breutelia Br. et Schpr.

- arcuata (Dicks.) — 172. Schweiz: Hepp.
- — — 1165. Norwegen: Kiaer.

Bruchia Schwaegr.

- vogesiaca Schw. — 306. Vogesen: Martin, dedit Graf R. zu Solms-Laubach.

Bryum Dill. L.

- alpinum L. — 94. Norwegen: Graf zu Solms-Laubach. Gehört zu B. Mühlenbeckii! Cf. Milde in Hedw. 1869 p. 54.
- — — 364. Baden: Bausch.
- — — 582. England: W. Curnow.
- annotinum 86 v. sub Webera.
- arcticum Br. et Schpr. — 274. Norwegen: Th. Jensen.
- argenteum L. — 92 et 238. Breslau: Milde; Dresden: C. A. Hantzsch.
- atropurpureum W. et M. — 87. Greifswald: Laurer.
- — — 240. Breslau: Milde.
- badium Bruch. — 1086. Wien: Juratzka.
- — — 1036b. Neumark: Ruthe.
- bimum Schreb. — 239. Breslau: Milde.
- — — 1027. Baiern: Fr. Arnold.
- bimum Schreb. — 833. Schweden: S. O. Lindberg.
- — elatum Schpr. — 932. England: Carrington.
- Blindii Br. et Schpr. — 1088. Schweiz: Pfeffer.
- caespitium L. — 90. Sachsen: L. R.
- — badium Bruch. — 91. — 1036a. Graubünden: Pfeffer.
- calophyllum R. Brown. — 876. England: Schimper.
- — — 930. England: Carrington.
- capillare L. — 1029. Neumark: Ruthe.
- — — 98. Baden: Jack.
- — cuspidatum Schpr. — 673. Frankreich: Paris.
- — Ferchellii Br. et Schpr. (una cum B. caespiticio!) — 580 Sabaudia: Paris.
- cirrhatum Hoppe et H. — 837. Mittelfranken: Fr. Arnold.
- — — 971. Graubünden: Holler.
- — — 1028. Neumark: Ruthe.
- cyclophyllum (Schw.) — 444. Ostpreussen: von Klinggräff.
- Duvalii Voit. — 835. Westphalen: H. Müller.
- elongatum Dicks. — 275. sub Webera.
- erythrocarpum Schw. — 244. Schlesien: Hilse.
- — — 471. Boekhorst (Niederlande): Sprée.
- — murorum Schpr. — 674. Frankreich: Paris.
- fallax Milde. — 242. Breslau: Milde.
- Funkii Schw. — 365. Preussen: v. Klinggräff.
- inclinatum (Sw.) — 97. Mecklenburg: Wüstnei.
- — — 966. sub B. longiseti: München: Holler.
- — — 1026. Baiern: Fr. Arnold. — 1087. Neumark: Ruthe.
- intermedium W. et M. — Greifswald: Laurer.
- — — 1030. Sachsen: L. R.
- julaceum Sm. — 243. Ober-Pinzgau: Schwartz.
- lacustre Bland. — 332. Breslau: Milde.
- — — 969. Jütland: Th. Jensen.
- longisetum Bland. — 966. München: Holler.
- luridum Ruthe — 1089. Neumark: Ruthe.
- macrostomum Jur. — 1085. Wien: Juratzka.
- Marratii Wils. — 731. Holland: v. d. Sande-Lacoste.
- Mildeanum Juratzk. — 676. Tyrol: Milde.
- Mühlenbeckii Br. et Schpr. — 472. Grimsel: Graf R. zu Solms-Laubach.
- murale Wils. — 1083. England: Hunt.
- Neodamense Jtz. — 929. England: Carrington.
- — — 972. Neumark: Ruthe.
- nutans Schreb. — 272. sub Webera.
- pallens Sw. — 89. Thüringen: Schliephacke; Mecklenburg: Wüstnei.
- — — 928. Lapponia umens.: A^ongström.

Bryum Dill. L.

- pallescens Schleich. — 241. Baiern: Arnold.
- — — 537. Chambéry: Paris.
- — — contextum Br. et Schpr. — 273. Norwegen: Th. Jensen.
- pendulum Hornsch. — 443. Sachsen: L. R.
- — — 836. Wien: Juratzka.
- — — 1118. England: W. Curnow; b. Neumark: R. Ruthe.
- pseudotriquetrum (Hedw.) — 95. Schlesien: Hilse.
- — — 271a Schwäb. Hall: Kemmler; b. Carpathen: Kalchbrenner.
- cavifolium Br. et Schpr. — 877. Jütland: Th. Jensen.
- pyriforme Hedw. sub Leptobryo.
- roscum Schreb. — 104. Dresden: Hübner.
- — — 1119. Traunstein (Oberbaiern): Dr. Progel.
- torquescens Br. et Schpr. — 331. Süd-Istrien: v. Tommasini.
- — — 875. Südfrankreich: Schimper.
- — — 933. Algier: Paris.
- turbinatum (Hedw.) — 96. Schlesien: Hilse; 675. Sachsen: L. R.
- — — 970. Jütland: Th. Jensen.
- — — elongatum. — 967. Salzburg: Sauter.
- — — latifolium Schl. — 622. Pasterze: Laurer.
- uliginosum Bruch. — 274. Norwegen: Th. Jensen.
- — — 931. England: Carrington.
- versicolor A. Braun. — 330. Strassburg: Schimper.
- — — 934. Baiern: Fr. Arnold.
- Warneum Bland. — 623. Marienwerder: v. Klinggräff.
- — — 834. Neusiedler See: Juratzka.
- — — 1084. Neumark: Ruthe.
- Willdenowii Jtz. — 973. Neumark: Itzigsohn.

Buxbaumia Hall.

- aphylla Hall — 111. Sachsen: L. R.; Böhmen: W. Siegmund.
- indusiata Brid. — 110. Grafschaft Glatz: Milde.

Camptothecium Schpr.

- aureum (Lagase.) — 689. Cannel-du-Lue: R. et Henri — ? dedit Buchinger.
- lutescens (Huds.) — 142. Thüringen: Schliephaeke.
- — — 592. England: Curnow.
- nitens (Schreb.) — 194. Salzburg: Schwartz.
- — — 764. Baden: Jack.

Campylopus Brid.

- alpinus Schpr. — 936. England: Hunt.
- atrovirens De Ntris. — 262. Schweiz: Killias.
- — — 312. Piemont: De Notaris et de Cesati.
- brevipilus Br. et Schpr. — 577. England: W. Curnow.
- flexuosus (L.) — 85. Württemberg: Kemmler.
- — — 576. England: W. Curnow.
- — — 976. Wien: Juratzka.
- fragilis (Dieks.) — 504. Thüringen: A. Röse.
- longipilus Brid. — 505. Irland: Carrington.
- — — 938. Schottland: Hunt.
- Mülleri Juratzka. — 578. Westphalen: H. Müller.
- polytrichoides De Ntris. — 507. Tyrol: Milde.
- — — 1060. Ischia: Kiaer.

Campylopus Brid.

- Schimper Milde. — 658. Tyrol: Milde.
- — — 1113. Schweiz: Dr. Pfeffer.
- Schwarzii Schpr. — 935. Schottland: Hunt.
- setifolius Wils. — 1055. Irland: Hunt.
- subulatus Schpr. — 451. Tyrol: Milde.
- turfaceus Bruch. et Schpr. — 506. Schweiz: A. Geheeb.

Campylostelium Br. et Schpr.

- saxicola (W. et M.) — 415. Oberfranken: Fr. Arnold.
- — — 613. Franken: Lorentz.

Catoscopium Brid.

- nigrum (Hedw.) — 128. Ober-Baiern: Bausch.

Ceratodon Brid.

- purpureus (L.) — 463. Altona (Holstein): Gottsche; Böhmen: Pf. Karl.

Cinclidium Sw.

- arcticum Br. et Schpr. — 975. Dovre (Norwegen): Kiaer.
- stygium Sw. — 105. Norwegen: Graf R. zu Solms-Laubach; Salzburg: Sauter.
- — — 1020. Lapponia umensis: A^ongström.

Cinclidotus P. B.

- aquaticus (L.) — 214. Istrien: v. Tommasini.
- — — 1133. Schweiz: Jack.
- fontinaloides (Hedw.) — 133. Im Rhein: Leiner.
- — — 1134. Saarufer: F. Winter.
- — — 216. Istrien: v. Tommasini.
- riparius (Hornsch.) — 215. Istrien: v. Tommasini.
- — — terrestris Br. et Schpr. sub 980.

Climacium W. et M.

- dendroides (L.) — 3. Görlitz: Peck; Böhmen: Pf. Karl.

Conomitrium Mont.

- Julianum (Savi). — 1. Stuttgart: G. v. Martens; Böhmen: Pf. Karl; Sachsen c. fr.: L. R.

Conostomum Sw.

- boreale Sw. — 129. Norwegen: Graf R. zu Solms-Laubach.

Coscinodon Spreng.

- pulvinatus Spr. — 127. Bugella: V. de Cesati.

Cryphaea Mohr.

- heteromalla (Hedw.) — 684. Frankreich: Sarrat-Gineste et Paris.

Cylindrothecium Schpr.

- cladorrhizans (Hedw.) — 343. Frankreich: Schimper; b. Helvet. insubr: Daldini.
- — — 767. Tyrol: Milde.
- concinnum (De Ntris) — 19. sub C. Montagnei!

Cynodontium Schpr.

- Bruntoni (Sm.) — 412. Baden: Bausch.
- gracilescens (W. et M.) — 462. Kärnten: Jack.
- polycarpon (Ehrh.) — 261. Carpathen: Kalchbr.
- virens (Hedw.) — 48. Salzburg: Schwartz.
- — — 411. Zermatt: Jack.
- Wahlenbergii Br. et Schpr. — 260. Norwegen: Th. Jensen.
- — — 862. Grönland: Breutel.

Daltonia Hook.

- splachnoides (Sm.) — 579. Irland: D. Moore.

Desmatodon Brid.

- cernuus Hueb. — 168. Schweiz: Killias.
- — — 957. Ortler: Milde.
- griseus Jur. — sub No. 1123. Nizza: Metzler.
- latifolius Hedw. — 253 ad 1064. Norwegen: Kiaer.
- nervosus Br. et Schpr. — 830. England: W. Curnow; b) Irland: D. Moore.
- systylius Br. et Schpr. — 958. Dovre (Norwegen): Kiaer.

Dichelyma Myrin.

- capillaceum (Dill.) — 778. Schweden: S. O. Lindbg.
- falcatum (Hedw.) — 628. Schweden: Lindberg.
- — — 779. Schlesien: Hilse.
- — — c. fr. 1132. Schlesien: E. Kühn.

Dichodontium Schpr.

- pellucidum (L.) — 77. Grafschaft Glatz: Milde.
- — — 425. Württemberg: Kemmler.

Dicranella Schpr.

- cerviculata (Hedw.) — 269. Braunschweig: Bertram.
- — — 1003. Baireuth: Walther et Molendo; b) Lapponia umensis: A^ongström.
- crispa (Hedw.) — 49. Sachsen: Hübner.
- curvata (Hedw.) — 413. Baden: Bausch.
- — — 1002. Fichtelgebirge: Molendo et Walther.
- Grevilleana (Br. et Sch.) — 267. Ober-Pinzgau: Schwartz.
- heteromalla (Hedw.) — 73. Sachsen, Böhmen, Baden: L. R., Karl, Jack.
- — — 265. Oberösterreich: Poetsch.
- rufescens (Turn.) — 266. Piemont: V. de Cesati; Böhmen: Pf. Karl.
- Schreberi (Hedw.) — 74. Baiern: Arnold; Niederlande: Büse.
- — — 1112. England: Hunt.
- squarrosa (Schrad.) — 943. Baden: Jack.
- subulata (Hedw.) — 414. Salzburg: Jack.
- varia (Hedw.) — 72. Greifswald: Laurer; Sachsen: L. R.; Thüringen: Schliephacke.
- — — callistoma Br. et Sch. — 268. Rütli (Schweiz): Hepp.

Dicranodontium Br. et Sch.

- aristatum Sch. — 318. Adersbach (Böhmen): Milde.
- longirostre (W. et M.) — 76. Grafsch. Glatz: Milde.
- — — 799. Tatra: Rehmann.
- sericeum Schpr. — 809. Saarbrück: Winter.
- — — 1001. Baireuth: Walther.

Dicranum Hedw.

- albicans Br. et Sch. — 264. Salzburg: Schwartz.
- — — 620. Lapponia pitensis: S. O. Lindberg.
- — — c. fr. — 1111. Graubünden (Schweiz): Dr. Pfeffer.
- asperula Mitt. — 940. England: W. Ph. Schimper.
- Blyttii Br. et Sch. — 1004. Finnland: S. O. Lindberg.
- — — 1170. Norrland: A^ongström.
- elongatum Schwaegr. — 263. Norwegen: Th. Jensen.
- — — 733. Lappland: A^ongström.
- falcatum Hedw. — 942. Sudeten: L. R.
- — — 984. Riva: Carestia.

Dicranum Hedw.

- flagellare Hedw. — 82. Vöslauer Haide: Schlieph.
- — — 864. Baiern: Arnold.
- — v. compactum Jur. — 1169. Unter-Oestreich: J. Juratzka.
- fragilifolium Lindb. — 619. Lapponia pitensis: S. O. Lindberg.
- fulvum Hook. — ? 568. Schweden: S. O. Lindberg.
- — — 983. Saarbrück: Winter.
- fuscescens Turn. — 1172. Schlesien: Limpricht.
- — flexicaule Br. et Schpr. — 865. Salzburg. Alpen: Laurer.
- hyperboreum (Gunn.) — 986. Dovre (Norwegen): Kiaer.
- longifolium Hedw. — 81. Riesengebirge: Milde.
- — — 939. Lapponia umensis: A^ongström.
- majus Tur. — 654. Meckl.-Schwerin: Brinkmann.
- montanum Hedw. — 109. Baiern: Fr. Arnold.
- — — 793. Galizien: Rehmann.
- Mühlenbeckii Br. E. — 866. Baiern: Fr. Arnold.
- palustre Lappyl. — 416. Riesengebirge: Milde.
- — — c. fr. — 861a. Jütland: Th. Jensen; b. Schweiz: Geheeb.
- — 1062. Norwegen: Kiaer.
- robustum Blytt. — 78. Norwegen: Schliephacke.
- — 1063. Norwegen: Kiaer.
- Sauteri Br. et Schpr. — 75. Ober-Baiern: Arnold.
- Schraderi Schwaegr. — 79. Grafsch. Glatz: Milde.
- — — 1171. Norrland: A^ongström.
- scoparium L. — 83. Böhmen: Pf. Karl; Baden: Jack.
- — curvulum Br. — 530. Sabaudia: Paris.
- — orthophyllum Schpr. — 868. Böhmen: Pf. Karl.
- Scottianum Turn. — 941. Vire (Frankr.): W. Ph. Schimper.
- spurium Hedw. — 84. Niederlausitz: Holla.
- Starkii W. et M. — 869. Sudeten: Breutel.
- thraustum Schpr. — 735. Baiern: Arnold.
- undulatum Br. et Schpr. — 80. Niederlande: Büse.
- — — 867. Galizien: Schliephacke.
- viride (Sull.) Lindb. — 1061. Finnland: S. O. Lindberg.
- — — 1110. Rhöngebirge: A. Geheeb.

Didymodon Hedw.

- cordatus Jur. — 923. Wien: Juratzka.
- — — 959. Schweiz: Pfeffer; Thüringen: Schliephacke.
- flexifolius (Dicks.) — 662. England: W. Curnow.
- luridus (Hrsch.) — 661. Strassburg: Paris; Westphalen: H. Müller.
- rubellus (Roth) — 375. Baden: Jack; Sachsen: Weicker; Böhmen: Karl; Schweiz: C. Cramer; Carpathen: C. Kalchbrenner.
- — — 860. Galizien: Rehmann.
- — — 1033. England: W. Curnow.
- rufus Lortz. — 621. Pasterze: Molendo et Lorentz.

Diphyscium Mohr.

- foliosum (L.) — 112. Thüringen: Schliephacke; Böhmen: W. Siegmund.

Discelium Brid.

- nudum (Dicks.) — 659. England: W. Curnow.
- — — 1031. Norwegen: Kiaer.

Dissodon Grev. et Arn.

- Frölichianus (Hedw.) — 158. Untersberg b. Salzburg: Schwartz.
- splachnoides (Thunb.) — 815. Lapp. umensis: A^ongström.

Distichium Br. et Schpr.

- capillaceum (L.) — 37. Sachsen: L. R.
- — — 377. Kärnthen: Jack.
- — — 531. Südfrankreich: Paris.
- — — 1109. Fichtelgebirge: Dr. Walther.
- inclinatum (Hedw.) — 741. Schweden: S. O. Lindberg.

Dryptodon Brid.

- ellipticus Brid. — 1005. England: Schimper.

Encalypta Schrb.

- apophysata Nces et Hsch. — 810. Lapp. umensis: A^ongström.
- ciliata Hedw. — 255. Norwegen: Th. Jensen; b) Schlesien: Hilsc.
- commutata N. et H. — 69. Vorarlberg: Arnold.
- rhabdocarpa Schwaegr. — 70. Glätzer Schneeberg: Milde.
- — f. gymnostoma. — 427. Ober-Baden: Jack.
- spathulata C. Müll. — 1163. Siebenbürgen: Pf. Barth.
- streptocarpa Hedw. — 68. Carlsruhe: Seubert; Riesengeb.: Milde; Sachsen: L. R.
- vulgaris Hedw. — 254. Oberösterreich: Poetsch.
- — 964. Oberbaden: Jack.
- — obtusa Br. et Sch. — 652. Meekl.-Schwerin: Brinkmann.

Entosthodon Schwaegr.

- curvisetus (Schw.) — 429. Brindisi (Neapel): L. R.
- — — 1032. Hyères: Schimper.
- Duriaei Mont. — 1056. Algier: Paris.
- cricetorum (De Ntris.) — 22. Neustadt in der Pfalz: Gumbel.
- — — 428. Münster: Wienkamp.
- — — 655. Pindray Frankreich: Chaboisseau.
- fascicularis (Dicks.) — 353. Baiern: Arnold; Piemont: V. de Cesati.
- Templetoni (Hook.) — 508. Irland: Dr. Carrington.

Ephemerella C. Müll.

- recurvifolia (Dicks.) — 1053. Neumark: Ruthe.

Ephemerum Hampe.

- cohaerens (Hedw.) — 160. Breslau: Milde.
- — — 1101. Wien: J. Juratzka.
- recurvifolium (Dicks.) — 1053. — Neumark: R. Ruthe.
- serratum (Schrb.) — 159. Thüringen: Schliephacke.

Eucladium Br. et Schpr.

- verticillatum (L.) — 21. Zweibrücken: Gumbel.
- — — 1157. Baireuth: Walther.

Eurhynchium Schpr.

- androgynum (Wils.) — 389 Lahnthal: Graf Solms.
- — — 595. England: W. Curnow.
- — — 1098. Southport: J. B. Wilson.

Eurhynchium Schpr.

- circinatum (Brid.) — 594. England: W. Curnow.
- — — 846. Rom: Schiedermayr.
- — — 1096. Algier: Paris.
- crassinervium (Tayl.) — 335. Schweiz: Killias.
- — — 478. Comer-See: de Cesati.
- diversifolium Br. et Sch. — 1143. Graubünden: Pfeffer.
- myosuroides (L.) — 481. Aschaffenburg: Geyer.
- — — 766. England: W. Curnow.
- piliferum (Schrb.) — 144. Oberbaden: Jack.
- — — 339. Baiern: Fr. Arnold.
- praelongum (L.) — 480. Schweiz: Geheeb.
- — — 698. socio E. circinato! Triest: Tommasini.
- — abbreviatum Sch. — 145. Schweiz: Hepp.
- — atrovirens Sch. — 593. England: W. Curnow.
- — c. fr. — 1097. England: W. Curnow.
- pumilum (Wils.) — 479. Bonn: P. Dreesen.
- Stokesii (Turn.) — 477. Aschaffenburg: Geyer.
- — — 697. Westphalen: H. Müller.
- striatulum (Spruce) — 388. Baiern: Arnold.
- striatum (Schrb.) — 336. Carpathen: C. Kalchbrenner.
- — meridionale Sch. — 337. Marseille: Schimper.
- — — 905. Algier: Paris.
- strigosum (Hoffm.) — 745. Baiern: Holler.
- — — 1144. Baiern: Fr. Arnold.
- Swartzii Turn. — 593. England: W. Curnow.
- Vaucheri Lesq. — 13. Baiern: Fr. Arnold.
- — — 338. Schweiz: Schimper.
- — — 1186. Rhöngebirge: A. Geheeb.
- velutinoides Bruch. — 635. Ober-Hessen: Graf R. zu Solms-Laubach.

Fabronia Raddi.

- oetoblepharis Schl. — 468. Tyrol: Milde.
- pusilla Radd. — 166. Florenz: Caldesi.
- — — 687. Mentone: Böttcher.
- — — 1181. Nizza: A. Metzler.

Fiedleria Rabenh.

- subsessilis (Schwaegr.) — 156. Wien: Reichardt und J. Bsteh.

Fissidens Hedw.

- adianthoides (L.) — 257. Renkom: Buse; Schlesien: Hilse.
- — — 828. England: W. Curnow.
- Bambergeri Schpr. — 656. Tyrol: Milde.
- Bloxami Wils. — 356. Tyrol: Milde.
- Bloxami Wils. — 356. Lahnthal bei Braunfels: Graf R. zu Solms-Laubach.
- — — 1107. Bärwalde: R. Ruthe.
- Bonvaleti Paris et Sch. — 945. Kabyliä: Paris.
- bryoides Hedw. — 727. Dresden: Biene.
- — var. intermedium Ruthe. — 1160. Preussische Neumark: Ruthe.
- — var. gymnandrus (Buse) Ruthe. — 1106. Rybnick: R. Fritze.
- exilis Hedw. — 258. Thüringen: Schliephacke.
- crassipes Wils. — 1105. Ober-Baiern: Dr. Progel.
- crassipes Wils. — 103. Baiern: Fr. Arnold.
- — — 469. Tyrol: Milde.
- grandifrons Brid. — 63. Bodensee: Leiner.
- — — 946. Algier: Paris.
- gymnandrus Buse. — 1106. Rybnick: Fritze.

Fissidens Hedw.

- incurvus (W. et M.) — 310. Calvados (Frankreich): Paris.
- — — 1108. Algier: Paris.
- — — crassipes Sch. — 311. — 1105 Oberbaiern: Dr. Progel.
- — — fontanus Br. et Sch. — 108. Baiern: Arnold.
- — — Mildeanus Schpr. — 470. Tyrol: Milde.
- — — osmundoides Hedw. — 353. Niederlande: Sprée; Sachsen: L. R.; Baden: Jack.
- — — — 863. Galizien: Schliephacke; Irland: Moore.
- — — polyphyllus Wils. — 944. North Wales: Hunt.
- — — pusillus Wils. — 1104. Oberbaiern: Dr. Progel; b. Bonn: P. Dreessen.
- — — rufulus Br. et Schpr. — 357. Salzburg: Sauter; b. Baden: Bausch.
- — — rupestris Wils. — 825. England: W. Curnow.
- — — taxifolius (L.) — 64. Baden: Jack.
- — — — 829. England: W. Curnow.
- — — var. parvula Curn. — 1058. Cornwall: W. Curnow.

Fontinalis Dill.

- antipyretica L. — 431. Ostheim v. d. Rhör: Mathilde Rauschenberger.
- — — dalecarlica Br. Eur. — 1179. Norrland: Ångström.
- — — hypnoides Hartm. — 629. Schweden: S. O. Lindberg.
- — — squamosa L. — 432. Sachsen: L. R.
- — — — 630. Riesengebirge: Milde.
- — — form. — 926. England: W. Curnow.
- — — latifolia — 927. Saarbrück: Ferd. Winter.
- — — tenella Br. et Sch. — 631. Bair Rheinpfalz: Hepp.

Funaria Schreb.

- calcarea Wahlbg. — 308. Baden: Bausch; Frankreich: Paris.
- — — 812. Schweden: S. O. Lindberg.
- — — patula Schpr. — 1164 Algier: Paris.
- — — convexa Spruce. — 409. Genua: De Notaris et Piccone.
- — — — 813? Hyères: Schimper.
- — — hibernica Hook. — 812! Ins. Gotland: S. O. Lindberg.
- — — hygrometrica (L.) — 309. Sachsen: L. R.

Glyphomitrium Brid.

- Daviesii Schpr. — 1161. Irland: D. Moore.

Grimmia Ehrh.

- anodon Br. et Schpr. — 319. Schweiz: Killias.
- — — 1011. Norwegen: Kiaer.
- — — apocarpa (L.) — 280. Oestr. Schlesien: Bernhard.
- — — rivularis Br. et Sch. — 857. Sachsen: Hübner.
- — — alpestris Schl. — 1127. Bornisch-Alpen: Anzi.
- — — arenaria Hampe. — 614. Harz: Lorentz.
- — — commutata Hüben. — 560. Westfalen: H. Müller.
- — — — 680. Elsass: Paris.
- — — — 1129. Aus dem Saarthale: Ferd. Winter.
- — — conferta Funk. — 562. Westfalen: H. Müller.
- — — crinita Brid. — 50. Schweiz: Hepp.
- — — — 511. Sabaudia: Paris.
- — — curvula Bruch sub 614.

Grimmia Ehrh.

- — — Donniana Sm. — 371. a. Riesengebirge: Milde; Tyrol: Laurer; b. Unterwalden: Cramér; Norwegen: Th. Jensen.
- — — — 858. Sachsen: L. R.
- — — elatior Br. et Schpr. — 618. Kärnten: Laurer.
- — — elongata Klf. — 616. Venedier-Gruppe: Molendo und Lorentz.
- — — funalis (Schw.) — 466. St. Gotthard: Graf R. zu Solms-Laubach.
- — — gigantea Sch. — 317. Salzburg: Sauter.
- — — — 1126. Bair. Alpen: Fr. Arnold.
- — — Hartmani Sch. — 465. Thüringen: A. Röse.
- — — — 682. Vogesen: Schimper et Paris.
- — — leucophaea Grev. — 185. Schlesien: Milde; Rhein: J. Kühn.
- — — — 920. Baiern: Fr. Arnold.
- — — Lubtomeda Schpr. — 510. Bonn: Dreessen.
- — — maritima Turn. — 183. Dublin: Moore.
- — — — 1081. Cornwall: W. Curnow.
- — — mollis Br. et Schpr. — 464. Velber Tauern: Lorentz.
- — — — 512. Norwegen: Th. Jensen.
- — — montana Bruch. — 563. Westfalen: H. Müller.
- — — Mühlenbeckii Schpr. — 1012. Ins. Hoyland: S. O. Lindberg.
- — — orbicularis Br. et Sch. — 316. Frankreich: Paris.
- — — — 513. Thüringen: A. Röse.
- — — ovata W. et M. — 276. — 1082. Tyrol: Jack.
- — — plagiopodia Hedw. — 126 Thüringen: Schliephacke.
- — — pulvinata (L.) — 319. Chur (Schweiz): Killias.
- — — Schultzei (Brid.) — 561. Oberlausitz: Breutel.
- — — scssitana De N. — 1175. Alp. Born.: M. Anzi.
- — — tergestina Tommas. — 184. Triest: v. Tommasini.
- — — — 370. Mte. Cenis: de Cesati.
- — — torquata Grev. — 617. Südtirol: Molendo.
- — — — 1128. St. Blasien: Zinkendrath.
- — — trichophylla Grev. — 681. Vogesen: W. Ph. Schimper.
- — — unicolor Grev. — 615. Südtirol: Molendo.

Gümbelia Hampe.

- erinita Hpe. — 50. Schweiz: Hepp; Sachsen: L. R.

Gymnostomum Hedw.

- bicolor Br. et Sch. — 29. Ober-Baiern: Arnold.
- — — calcarum N. et Hsch. — 62 Oberösterreich: Poetsch.
- — — — 351. Oberfranken: Fr. Arnold.
- — — — 1155. Traunstein: Progel; b. Algier: Paris.
- — — curvirostre Ehrh. — 60. Piemont: V. de Cesati.
- — — pallidisetum Br. et Sch. — 725. Kärnten: Jack.
- — — microstomum Hedw. — 307. Breslau: Milde.
- — — obliquum — 407. Lahnthal: Graf Solm.
- — — rupestre Schwaegr.
- — — compactum Br. et Sch. — 406. St. Gotthard: Jack.
- — — squarrosum N. et Hsch. — 404. Bonn: P. Dreessen.
- — — subsessile Schw. — 156. Wien: Reichardt.
- — — systylium Fk. — 401. vide sub Pottia.
- — — tenue Schrad. — 61. Thüringen: Schliephacke.
- — — — 405. Schwäb. Hall: Kemmler.
- — — f. major. — 738. Baden: Jack.
- — — tortile Schwaegr. — 408. Sabaudia: Paris.

Habrodon Schpr.

- Notarisii Schpr. — 903. Schottland: G. E. Hunt.
- — — 1180. Nizza: A. Metzler.

Hedwigia Ehrh.

- ciliata (Dicks.) — 514. Ungarn: Kalchbrenner.
- — leucophaca Schpr. — 679. Frankreich: Paris.
- seiuroides De Ntris. — 186. sub Braunia!

Hedwigidium Br. et Sch.

- imberbe (Sm.) — 921. North Wales: G. E. Hunt.

Heterocladium Schpr.

- dimorphum (Brid.) — 993. Graubünden: Pfeffer.
- 8 — heteropterum (Bruch.) — 539. Bonn: P. Dreesen.
- — — 643. Schweden: Lindberg.

Homalia Brid.

- lusitanica Sch. — 467. Istrien: v. Tommasini.
- Sendtneriana (Br. et Sch.) — 610. Tyrol: Molendo.
- — — 379. Franken: Arnold.
- trichomanoides (Schreb.) — 71. Salzburg: Sauter; Baden: Jack.

Homalothecium Schpr.

- Philippeanum (Spruce) — 139. Glätz: Schneeberg: Milde.
- — — 344. Jura: Schimper.
- — — 487. Carpathen: Kalchbrenner.
- — — 1190. Siebenbürgen: Barth.
- sericeum (L.) — 446. Carlsruhe: Bausch.

Hookeria Tayl.

- laete virens (Hook. et T.) — 586. England: W. Curnow; Irland: D. Moore.
- lucens Sm. — 2. Oberlausitz: Peck; Bonn: J. Kühn.

Hylocomium Schpr.

- brevirostre (Ehrh.) — 391. Ober-Hessen: Graf R. zu Solms-Laubach.
- loreum (L.) — 18. Sachsen: L. R.
- Oakesii (Sull.) — 17. Salzburg: Schwartz.
- — — 638. Bairische Alpen: Lorentz et Molendo.
- splendens (Hedw.) — 193. Schlesien: Hilse; Böhmen: Siegmund; Sachsen: L. R.
- squarrosum (L.) — 138. Sachsen: Hübner.
- — — 845. Baiern: Fr. Arnold.
- subpinnatum Lindb. — 1043. Fichtelgebirge: Walther et Molendo.
- triquetrum (L.) — 192. Oestr. Schlesien: Bernhardt.
- — — f. macra — 392. Haarlem: Buse.
- umbratum (Ehrh.) — 191. Salzburg: Schwartz.
- — — 1185. Rhönggeb.: Geheeb.

Hymenostomum Nees. — Cf. Gymnostomum.

- microstomum R. Br. sub 307.
- squarrosum Nees — 24. Zweibrücken: Th. Gumbel.

Hyocomium Schpr.

- flagellare (Dicks.) — 14. Baden-Baden: Bausch.
- — — 590. England: W. Curnow.

Hypnum (Dill.) Br. et Schpr.

- aduncum (Hedw., L.)
- — — var. laxifolium, forma nutans Jur. — 1198. Galizien: Schliephacke.
- — — gracilescens Schpr. — 546. Ober-Oestreich: Poetsch.
- — — inundatum Schpr. — 917. Saarbrück: Ferd. Winter.
- alopecurum L. sub 292 et 902 c. fr.

Hypnum (Dill.) Br. et Schpr.

- alpestre Sw. — 913. Lappland: Aⁿgström.
- arcticum Sommf. — 648. Nordtyrol: Lorentz et Molendo.
- — — 912. Lappland: Aⁿgström.
- 9 — areuatum Lindb. — 476. Tyrol: Milde.
- — — 743. Bonn: P. Dreesen.
- Bambergeri Schpr. — 908. Rhät. Alpen: Pfeffer.
- callichroum Bruch. — 12. Salzburg: Sauter.
- — — 347. Vogesen: W. Ph. Schimper.
- chrysophyllum Brid. — 791. Krakau: Rehmann.
- — — protensum. — 493. Carpathen: C. Kalchbrenner.
- commutatum Hedw. — 349. Oberösterreich: Poetsch.
- — — 1146. Baden: Jack.
- — — 744. Böhmen: Siegmund.
- — — faleatum Br. et Sch. — 742. Salzburg: Sauter.
- — — — 897. Galizien: Schliephacke.
- — — fluctuans Schpr. — 495. Sabaudia: Paris.
- — — cordifolium Hedw. — 195. Salzburg: Schwartz.
- — — 498. Braunschweig: Bertram.
- — — crista-castrensis L. — 147. Ober-Baiern: Bausch; Baden: Jack; Oberösterreich: Poetsch.
- — — cupressiforme L. — 197. Schweiz: Hepp.
- — — 763. Tatra: Rehmann.
- — — elatum Schpr. — 918. Saarbrück: Ferd. Winter.
- — — ericetorum Sch. — 763. d. Saarbrück: Ferd. Winter; Westphalen: H. Müller.
- — — filiforme Sch. — 198. Schwäb. Hall: Kemmler.
- — — 496. Sabaudia: Paris.
- — — resupinatum Sch. — 910. Jütland: Th. Jensen.
- — — 1050. England: W. Curnow.
- — — teetorum Sch. — Baden: Bausch.
- — — cuspidatum L. — 397. Braunschweig: Bertram; Schlesien: Goepfert.
- — — dolomiticum Milde — 695. Seiser-Alp: Milde.
- — — elodes Spruce — 395. Breslau: Milde; Strehlen (Schlesien): Hilse.
- — — eugyrium Schpr. — 650. Irland: Carrington.
- — — exannulatum Gumb. — 754. Riesengebirge: Milde.
- — — 849. Oberpfalz: Fr. Arnold.
- — — 896. Galizien: Schliephacke; Westfalen: Wienkamp.
- — — 918. England: W. Wilson.
- — — v. Rotae DN. — 1100. Graubünden: Pfeffer.
- — — fallaciosum Jur. — 647. Tyrol: H. Lohse.
- — — fastigiatum Brid. — 398. Norwegen: Th. Jensen.
- — — 696. Seiser-Alp: Milde.
- — — fertile Sendtn. — 8. Salzburg: Schwartz.
- — — filicinum L. — 998. sterile. Baden: Jack; Galizien: Schliephacke.
- — — c. fr. 1047. Bärwalde (N. M.): Ruthe.
- — — fluitans Hedw. — 196. Salzburg: Schwarz.
- — — 1044. Hamburg: Reckahn.
- — — alpinum Schpr. — 1045. Lappland: Aⁿgström.
- — — pseudostramineum H. Müll. — 848. Westfalen: H. Müller.
- — — giganteum Schpr. — 549. Egelsee (Schweiz): Geheeb; Berlin: Al. Braun.
- — — 762. Leipzig: Bulnheim; Arnheim: Buse.
- — — Haldanianum Grev. — 346. Schlesien: Hilse.
- — — Halleri L. f. — 146. Schlesien: Milde; Ober-Baiern: Bausch; Vorarlberg: Jack.
- — — 499. Carpathen: Kalchbrenner.
- — — 756. Tyrol: Milde.
- — — 999. Baiern: Fr. Arnold.

Hypnum (Dill.) Br. et Schpr.

- Heufleri Jur. — 694. Seiser Alp: Milde.
- — — 909. Rhät. Alpen: Pfeffer.
- — — 1199. Südtirol: Arnold.
- hamulosum Br. et Schpr. — 491. Tyrol: Lorentz.
- hygrophilum Jur. — 649. Bonn: P. Dreesen.
- imponens Hedw. — 644. Westfalen: H. Müller.
- — — 1046. Finnland: Lindberg.
- incurvatum Schrd. — 1194. Schweiz: Dr. Pfeffer.
- insigne Milde. — 489. Salzburg: Milde.
- Kneiffii (Br. et Sch.) — 692. England: W. Curnow; Oberösterreich: Poetsch.
- — — 898. Baiern: Holler.
- Lorentzianum Molendo — 488. Tyrol: Lorentz.
- lycopodioides Schwaegr. — 752. Galizien: Schliephacke.
- — — 914. England: Carrington.
- — — 1200. Süd-Baiern: Progel.
- micans Wils. — 545. Irland: Carrington.
- Mildeanum Schpr. — sub 597, 747 et 1037.
- molle Dicks. — 899. Riesengebirge: Milde.
- molluscum Hedw. — 11. Württemberg: Kemmler.
- — condensatum Schpr. — 492. Schweiz: Hepp.
- murale Hedw. sub 293 et 384.
- myosuroides L. sub 4·2 et 766.
- myurum Brid. sub 190 et 485.
- nitens Schreb. sub 194.
- ochraceum Wils. — 693. England: W. Curnow.
- — — 844. Lappland; Ångström.
- Oakesii Sull. sub 17 et 638.
- pallescens Schpr. — 9. Salzburg: Schwarz.
- — — 1048. Fichtelgebirge: Walther et Molendo.
- — — 1196. Riesengebirge: Limpricht.
- palustre L. — 294. Baden: Jack.
- — — 393. Jütland: Th. Jensen.
- — subsphaericarpon 550 ad H. filicinum pertinet!
- piliferum Schreb. sub 144 et 339.
- plumosum Brid. sub 449, 485 et 1040.
- polycarpon Bland. — 400. Berlin: A. Braun.
- — — 692. Oberösterreich: Poetsch.
- polygamum (Br. et Sch.) — 755. Westfalen: H. Müller.
- — — 1000. England: W. Curnow.
- populeum Hedw. sub 773 et 1041.
- pratense Koch. — 200? et 394.
- — — 761. Saarbrücken: Ferd. Winter.
- — — 1049. Baireuth: Molendo et Walther.
- procerrimum Molendo — 907. Rhät. Alpen: Pfeffer.
- purum L. 199. Baden: Jack.
- — — 494. Oberösterreich: Poetsch; Sachsen-Weimar: Geheeb.
- reptile Mich. — 299. Norwegen: Th. Jensen; Riesengebirge: Milde.
- resupinatum Wils. — 1050. England: W. Curnow.
- revolvens Sw. — 996. Westfalen: H. Müller.
- rugosum Ehrh. — 148. Baden: Jack.
- ruscifolium Neck. sub 385.
- rutabulum L. sub 387.
- sarmentosum Wahlbg. — 149. Norwegen: Graf R. zu Solms-Laubach.
- — — 760. Schlesien: Hiltse.
- Sauteri Br. et Sch. — 500. Salzburg: Sauter.
- Schreberi Willd. — 298. Oberösterreich: Poetsch; Böhmen: Siegmund und Pf. Karl; Schlesien: Goeppert.

Hypnum (Dill.) Br. et Schpr.

- scorpioides L. — 10. München: Fr. Arnold.
- — — 771. f. tenuis. Baden: Leiner.
- Sendtneri Schpr. — 646. Wien: Juratzka.
- — — 757. Galizien: Schliephacke.
- — — 850. c. fr. ibid.: idem.
- — — Wilsoni Schpr. — 915. England: Carrington et G. Wilson.
- serpens L. sub 136.
- Sommerfeltii Myr. — 396. Ostpreussen: v. Klinggräff.
- splendens Hedw. sub 193.
- stellatum Schreb. — 497. Chambery (Sabaudia): Paris.
- — — 759. Baden: Geheeb.
- stramineum Dicks. — 645. Oberösterreich: Poetsch.
- — — 847. Westfalen: H. Müller.
- — — 1145. Carpathen: Kalchbrenner.
- striatum Schrb. sub 336.
- strigosum Hoffm. sub 745.
- subsulcatum Schpr. — 910. Rhät. Alpen: Pfeffer.
- trifarium W. et M. — 300. Schlesien: Milde.
- — — 751. Galizien: Schliephacke.
- triquetrum L. sub 192.
- turgescens Schpr. — 490. Berchtesgaden (Baiern): Milde und Lorentz.
- umbratum Ehrh. sub 191.
- uncinatum Hedw. — 792. Galizien: Rehmann; b. Stockholm: L. R.
- — — 1195. Ungarn: C. Kalchbrenner.
- — plumosum Schpr. — 548. Sabaudia: Paris.
- undulatum L. sub 296.
- vernicosum Lindbg. mas! — 547. Oberösterreich: Poetsch.
- — — 753. Galizien: Schliephacke.
- — — 1197. Saarbrücken: Ferd. Winter.
- Vaucheri Lesq. — 13. Baiern: Arnold.
- — — 758. (Wien: Juratzka ex errore) Seiser. Alpe bei Bozen: Milde.
- velutinoides Bruch sub 635.
- velutinum sub 187.
- Wilsoni Schpr. — 546. Oberösterreich: Poetsch.

Isothecium Brid.

- myurum Brid. — 190. Schweiz: Hepp; Ober-Lausitz: Peck.
- — — 485. Sabaudia: Paris.

Lamprophyllum Lindb.

- pulchellum (Hedw.) 1021. Finnland: L. O. Lindberg

Leptobryum Schpr.

- pyriforma (L.) — 93. Meckl. Schwerin: Wüstnei; Ober-Baden: Jack.

Leptodon Mohr.

- Smithii (Dicks.) — 538. Südtirol: Milde.
- — — mas: 688. Toscana: Beccari.
- — — c. fr. 992. Algier: Paris.

Leptotrichum Hampe.

- flexicaule (Schwaegr.) — 423. Baden: Jack, Bausch.
- — — 961. Württemberg: Kemmler.
- glaucescens (Hedw.) — 627. Graubünden: Killias.

Leptotrichum Hampe.

- homomallum (Hedw.) 424 = *L. tortile* pusillum.
- — — 663. Vogesen: Paris.
- pallidum (Schreb.) 167. Schlesien: Hilse.
- — — 664. Baden: Jack.
- tortile (Schrad.) — 424. Aschaffenburg: Geyer.
- — — 872. Baden: Jack; Württemberg: Wienkamp.
- — — pusillum Br. et Schr. — 947. Lapponia umensis: A^{ng}ström.
- vaginans Sulliv. — 824. Westfalen: H. Müller.

Lescuraea Schpr.

- striata (Schw.) 150. Böhmen: Siegmund.

Leskea Hedw.

- attenuata Hedw. sub. 334.
- complanata Brid. sub. 378 et 609.
- nervosa (Schwaegr.) — 445 Riesengebirge: Milde.
- — — 1187. Rhöngelbirge: Geheeb.
- paludosa Hedw. sub. 381.
- polyantha Hedw. sub. 382.
- polycarpa Ehrh. — 782. Sachsen: L. R.; Baden: Bausch.
- — — paludosa Br. et Schpr. — 381. Carpathen: Kalchbrenner.
- — — 783. Schweiz: Hepp.
- rostrata Hedw. — 5. Salzburg: Sauter.

Leucobryum Hampe.

- glaucum (L.) — 32. Sachsen: L. R.

Leucodon Schwaegr.

- sciuroides (L.) — 137. Arnheim (Niederlande): Buse.
- — — 1191. Siebenbürgen: J. Barth.

Limnobium Schpr.

- arcticum Br. Eur. — 1142 Graubünden: Pfeffer.
- eugyrium Schpr. — 295. Baden: Bausch.
- palustre (L.) — 294. Baden: Jack.
- ochraceum Wils. — 844. Lapp. umensis: A^{ng}ström.

Meesia Hedw.

- Albertinii Br. et Schpr.
- longiseta Hedw. — 362. Baden: Leiner.
- tristicha (Fk.) — 736. Baden: Holler.
- — — mas! — 736. c. Galizien: Schliephacke.
- uliginosa Hedw. — 100. Ober-Bayern: Bausch.
- — — 737. Wetterau: Ph. Russ.
- — — 439. Löbau in Pr.: v. Klinggräff.
- — — alpina Br. et Sch. — 440. Vorarlberg: Jack.

Microbryum Schpr.

- Floerkeanum (W. et M.) — 1102. Neumark: R. Ruthe.

Mielichhoferia Nees et H.

- nitida N. et H. — 575. Pinzgau: Graf Bentzel-Sternau.

Mnium L.

- affine Bland. — 328. Vogesen: W. Ph. Schimper et Paris.
- — — 1120. Traunstein: Progel.
- Blytii Br. et Sch. — 977. Norwegen: Kiaer.
- cinclidioides Blytt. — 436. Riesengebirge: Milde; Coburg: Geheeb.
- — — 1019. Lapponia umensis: A^{ng}ström.

Mnium L.

- cuspidatum Hedw. — 102. Arnheim: Buse.
- — — 435. Aschaffenburg: Geyer.
- hornum L. — 38. Böhmen: Pf. Karl; Lausitz: Peck.
- hymenophylloides Hueben. — 978. Norwegen: Kiaer.
- hymenophyllum Br. et Sch. — 246. Norwegen: Th. Jensen.
- lycopodioides Hook. — 248. Ober-Pinzgau: Schwartz.
- medium Br. et Schpr. — 1166. Finnland: S. O. Lindberg.
- orthorrhynchum Br. et Sch. — 39. Ober-Baiern: Arnold.
- punctatum L. — 327. Sächs. Erzgebirge: Delitzsch; Württemberg: Kemmler.
- rostratum (Schrad.) 250 Riesengebirge: Milde.
- serratum (Schrad.) — 536. Chamberg (Sabaudia): Paris.
- — — 1167. Süd-Baiern: Dr. Progel.
- spinosum (Voit) — 40. Ober-Baiern: Arnold.
- — — mas! 437. Baiern: Arnold.
- spinulosum Br. et Sch. — 249. Riesengebirge: Milde.
- stellare L. — 103. Baden: Jack.
- subglobosum Br. et Sch. — 247 (sterile!) Norwegen: Th. Jensen; Westfalen: H. Müller.
- — — 730. c. fr. Lapp. umensis: A^{ng}ström.
- undulatum Hedw. — 41. Sachsen: L. R; Neumark: Lasch.

Myurella Schpr.

- apiculata (Hueben.) —
- julacea (Vill.) — 685. Oberösterreich: Schiedermayr.

Myurium Schpr.

- Hebridarum Schpr. — 950. North Uist Hebridarum: J. Shaw, W. Ph. Schimper.

Neckera. Hedw.

- complanata (L.) — 378. Coburg: Geheeb.
- — — 609. Schweden: Lindberg.
- — — forma propria! — 380. Baden: Jack et Leiner.
- crispa (L.) — 143 Baden: Jack.
- oligocarpa Br. et Sch. — 1034 Norwegen: Scheutz.
- pennata Hedw. — 291. Schlesien: J. Kühn.
- — — 1035. Baiern: Arnold.
- Philippeana Schpr. — 749 Oberpfalz: Arnold. = pilifera Jur.
- pumila Hedw. — 748. Oberpfalz: Arnold.
- — — f. saxicola. — 1139 Graubünden: Dr. Pfeffer.
- Notarisia italica Hpe. sub. No. 306.

Oedipodium Schwaegr.

- griffithianum Schwaegr. — 1159. Norwegen: Kiaer.

Oligotrichum De C.

- hereynicum (Ehrh.) 144 Sabaudia: Duby.

Oreas Brid.

- Martiana (Hornsch) — 47. Ober-Pinzgau: Schwartz.
- — — 1066. Graubünden: Pfeffer.

Orthodontium Schwaegr.

- gracile (Wils.) — 677. England: W. Curnow.

Orthothecium Schpr.

- chryscom (Schw.) — 944. Norwegen: Kiaer.
- intricatum (Hartm.) 345. Baiern: Arnold.
- rufescens (Dicks.) — 134. Ober-Baiern: Bausch.
- — — 290. Carpathen: Kalchbrenner.

Orthotrichum Hedw. — Conf. Ulota.

- affine Hedw. — 279. Sachsen: L. R.; Böhmen: Karl.
- — — 890. Wien: Juratzka.
- anomalum Hedw. — 181. Baden: Jaek; Oestr.-Schlesien: Bernhard; Schlesien: Hilse; Neumark: Lasch.
- calvoscens Carr. 520. England: Carrington.
- coarctatum P. B. sub 569.
- crispum Hedw. 178. Baden: Bausch.
- — — 521. Irland: Carrington.
- crispulum Bruch — 179. Sachsen: L. R.; Böhmen: Siegmund, Ph. Karl.
- eupulatum Hoffm. — 177. Baiern: Fr. Arnold.
- — — 891. Schweden: Lindberg. Württemberg: Kemmler.
- — v. Rudolfianum — 1073. Westfalen: H. Müller.
- curvifolium Wahlbg. — 182. Mittersill: Sauter.
- — — 222. Norwegen: Th. Jensen.
- diaphanum Schrad. — 180. Wetzlar: Graf Solms.
- — — 1009. England: W. Curnow.
- — — 1176. Bodensee: Leiner.
- Drummondii Grev. — 881. Irland: Dr. Moore.
- fallax Schpr. — 125. Schlesien: Hilse.
- — — 372. Baden: Seubert.
- fastigiatum Bruch. — 434. Schweiz: Hepp.
- — — 892. Schlesien: Schliephacke.
- gymnostomum Bruch. — 1074. Schweden: Zetterstedt.
- Hutchinsiae Sm. — 1007. vide sub Ulota.
- Killiasii C. M. — 988. Graubünden: Pfeffer.
- leiocarpum Br. et Sch. — 516. Thüringen: Lucas.
- — — 883. Böhmen: Karl.
- leucomitrium Bruch — 989. Baiern: Arnold.
- Ludwigii Brid. — 519. Cant. Aargau: A. Geheeb.
- Lyelli Hook et Tayl. — 518. Thüringen: A. Röse.
- — — 1006. Schweden: Scheutz.
- obtusifolium Schrad. — 517. Aschaffenburg: Geyer. 1075. Schweden: Zetterstadt.
- — — 885. Oesterreich-Schlesien: Schliephacke.
- phyllanthum Brid. sub 959.
- pulchellum Sm. — 887. Jütland: Th. Jensen.
- — — 1079. England: Curnow.
- pumilium Sw. — 372. Baden: Seubert.
- rivulare Turn. — 833. Taunus: R. Graf zu Solms-Laubach. 1077. Schottland: W. Ph. Schimper.
- speciosum Nees — 433 = O. affine! Schleusingen: A. Geheeb.
- — — 889. pl. vera! Neumark: Lasch.
- stramineum Hornsch. — 373. Vogesen: Graf R. zu Solms-Laubach.
- — — 1076. Baiern: Arnold.
- Sturmii Hopp. — 884. Irland: Moore.
- — — 987. Saarbrücken: Winter.
- — — 1008. Neumark (Preussen): Ruthe.
- tenellum Bruch. 1078. England: J. B. Wilson.
- — — 1078b. Münster: Wienkamp.
- urnigerum Myr. — 886. Harz: Lorentz.

Paludella Ehrh.

- squarrosa (L.) — 42. Meckl.-Schwerin: Wüstnei.
- — — steril — 1114. Wien: J. Juratzka.

Pharomitrium Schpr. = Fiedleria.**Phascum L.**

- alternifolium Brid. sub 153.
- axillare Dicks. sub 403.
- bryoides Dicks. 303. Thüringen: Lucas; Schlesien: Hilse.
- cohaerens Hedw. — 160. Breslau: Milde.
- crispum Hedw. — 30. Piemont; V. de Cesati.
- curvicolium Hedw. — 154. Thüringen: Lucas.
- cuspidatum Schreb. — 304. Wetzlar: Graf Solms; Greifswald: Laurer; Dublin: Moore.
- — — 852. Coburg: Geheeb.
- — piliferum Br. et Sch. — 963. England: W. Curnow.
- — Schreberi Br. et Sch. — 853. Sachsen: L. R.
- muticum Schreb. sub 151. Acaulon.
- rectum Sm. —
- rostellatum Brid. sub 162.
- triquetum Spruc. sub 164.
- subulatum L. sub. 152.

Philonotis Brid.

- calcarea Br. et Sch. — 130. Dänemark: Th. Jensen.
- — — Mas! 1117. — Prielgebirge (Ober-Oesterreich): Schiedermayr.
- — — 176. Schlesien: Milde.
- — — 1116. — Tatra: Kalchbrenner.
- — f. elongata 965. Salzburg: Sauter.
- capillaris Lindb. 1115. — Holland: van d. Sande Lacoste.
- fontana L. — 131. Böhmen: Ph. Karl.
- marchica Willd. — 574. Marienwerder: v. Klinggräff.
- — — 1017. Neumark: Ruthe.
- rigida Brid. — 1018. Irland: Moore.

Physcomitrella Schpr.

- patens (Hedw.) — 161. Constanz: Leiner.
- — — 1055. Carpathen: C. Kalchbrenner.

Physcomitrium Brid.

- pyriforme (L.) — 55. Sachsen: C. A. Hantzsch.
- sphaericum (Schwaegr.) — 25. Zweibrücken: Gümbel.
- — — 855. Schlesien: Hilse ist = Ph. eurystoma Cf. Milde in Hedw. 69 p. 55.
- — v. cuspidatum Dor. et M. — 54. Arnheim Buse = Ph. eurystoma!
- — scrotinum — 452. Sachsen: Hübner.

Plagiothecium Schpr.

- denticulatum (L.) — 691. Vogesen: Schimper et Paris.
- — densum Schpr. 390 = Rhynchostegium elegans.
- Gravetii Piré — 1193. Belgien: Gravet.
- latebricola (Wils) — 543. Thüringen: A. Röse; Baiern: Arnold.
- Mühlenbeckii Schpr. — 901. Jütland: Th. Jensen.
- nitidulum (Wahlbg.) — 297. Baiern: Arnold.
- piliferum (Sw.) — 632. Stockholm: S. O. Lindberg.

Plagiothecium Schpr.

11. — pulchellum (Hedw.) — 16. Salzburg: Schwartz.
 — Roeseanum (Hpe.) — 589. Bonn: P. Dreesen.
 — Schimper Mild. et Jur. — 588 = Rhynchostegium elegans.
 — Schimper M. et Jur. — 1093 verum! Jütland: Th. Jensen.
 — Schimper M. et Jur. verum. — 1189. Südbaiern: Progel.
 — silesiacum (Sel.) — 690. Vogesen: W. Ph. Schimper.
 — striatellum (Brid.) — 1092. — Finnland: S. O. Lindberg.
 — sylvaticum (L.) — 448. Baden: Bausch.
 — — orthoeladium Sch. — 140. Baden: Jack.
 — — cavifolium Jur. — 765. Salzburg: Sauter.
 — — 843. Saarbrücken: Winter; Oesterreich-Schlesien: Schliephacke.
 — undulatum (L.) — 296. Böhmen: Hilse.

Platygyrium Schpr.

- repens (Brid.) — 4. a) Schlesien: Hilse, b) Salzburg: Sauter.
 — — — 990. Tirol: Milde.

Pleuroidium Brid.

- alternifolium Br. et Sch. — 153. Schlesien: Bernhard, Milde.
 — nitidum (Hedw.) — 403. Breslau: Milde.
 — subulatum (L.) — 152. Thüringen: Lucas.

Pogonatum P. B.

- aloides (Hedw.) 116. Böhmen: Pf. Karl; Sachsen: L. R.
 — — — 1136 Saarbrück: Ferd Winter.
 — — minus — 811. England: W. Curnow
 — alpinum (L.) — 284. Norwegen: Th. Jensen.
 — — septentrionale Br. et Sch. — 285. Ober-Pinzgau: Schwartz.
 — nanum (Hedw.) — 288. Konstanz (Baden): Leiner.
 — urnigerum L. — 115. Thüringen: Schliephacke.

Polytrichum L.

- commune L. — 119. Sachsen: L. R.
 — — uliginosum Hüben. — 120. Böhmen: Pf. Karl.
 — formosum Hedw. — 118 Stuttgart: G. v. Martens.
 — gracile Menz. — 122. Dänemark: Th. Jensen.
 — juniperinum Hedw. — 810. Schweden: Scheutz.
 — piliferum Schrb. 121. Niederlausitz: Schumann; Böhmen: Pf. Karl.
 — sexangulare Hopp. — 732. Riva (Val sesia): Carestia.
 — strictum Menz. — 117. Mecklenburg: Wüstnei.
 — — — 1010. Schweden: Scheutz.

Pottia Ehrh.

- affinis (Nees et H.) — 58. Greifswald: Laurer.
 — cavifolia Ehrh. — 26. Landau: Gümbel.
 — — — 724. Irland: D. Moore.
 — — v. gracilis Wils. — 1051. Oxford et Dublin: Boswell et D. Moore.
 — crinita Wils. — 805. England: W. Curnow; Irland: D. Moore.
 — Heimii (Hedw.) — 401. Spandau: A. Braun.
 — — — 807. Halle: Balnheim.

Pottia Ehrh.

- intermedia (Schwaegr.) — 57. Sachsen: L. R.
 — minutula (Schwaegr.) — 27. Landau: Gümbel.
 — — — 854. Rostock: Brickmann.
 — — — 954. Baiern: Fr. Arnold.
 — — rufescens Br. et Sch. — 163. Breslau: Milde.
 — mutica Vent. n. sp. — 1052. Trient: Venturi.
 — subsessilis sub 156.
 — truncata (L.) 797. England: W. Curnow.
 — — major Br. et Schw. — 57. sub P intermedia.
 — — — 723. Saarbrücken: Ferd. Winter.
 — Wilsoni Hook. — 806. Irland: D. Moore.
 — — — 955. Penzance (England): W. Curnow.

Pseudoleskea Schpr.

- atrovirens (Dicks) 6. Salzburg: Schwartz.
 — — — 781. Oberfranken: Fr. Arnold.
 — — c. fr. — 991. Norwegen: Kiaer.
 — — 1184. Rhöngebirge: A. Geheeb.
 — catenulata Brid. — 642. Schweden: Lindberg; Baden: Jack.
 — — — 780. Tirol: Milde.
 — — — 1183. Rhöngebirge: A. Geheeb.
 — tectorum Schpr. — 600. Carlsruhe: Bausch.

Pterigynandrum Hedw.

- filiforme (Timm.) — 637. Baden: Jack; Böhmen: Karl.

Pterogonium Sw.

- gracile (L.) 475. Tirol: Milde.
 — — — 686. Frankreich: Chaboisseau.

Pterygophyllum Brid.

- lucens (L.) 2. Görlitz: Peck; Bonn: J. Kühn.

Ptychomitrium Br. et Schpr.

- glyphomitrioides de Ntris sub 305
 — polyphyllum (Dicks.) — Piemont: V. de Cesati.
 — — — 571. England: W. Curnow.
 — pusillum Br. et Schpr. — 305. — 305. Como: V. de Cesati.

Pylaisia Schpr.

- polyantha (Schreb.) — 382. Carpathen: Kalchbrenner; Sachsen: L. R.

Pyramidula Brid.

- tetragona Brid. — 155. Schlesien: Hilse.
 — — — 352. Carpathen: Kalchbrenner.
 — — — 1162. Siebenbürgen: J. Barth.

Racomitrium Brid.

- aciculare (L.) 220. = R heterostichum β alopecurum. Baden: Bausch.
 — — — 1178. Saarbrücken: F. Winter.
 — canescens (Hedw.) 219. Baden: Bausch; Böhmen: Karl.
 — — — 1013. Finnland: S. O. Lindberg.
 — ellipticum (Turn.) 1005. England: W. Th. Schimper.
 — — — 1177. Norwegen: Kiaer.
 — fasciculare Schrad. — 314. Vogesen: W. Ph. Schimper et Paris.
 — heterostichum (Hedw.) — 218. Harz: Bertram; Baden: Bausch.
 — lanuginosum (Hedw.) 374. Sachsen: Rostock, Hübner, L. R.

Racomitrium Brid.

- microcarpum (Hedw.) 217. Norwegen: Th. Jensen.
- — — 1014. Fichtelgebirge: Walther et Motendo.
- patens (Dicks.) — 315. Vogesen: W. Ph. Schimper et Paris.
- protensum Al. Braun. — 221. Baden: Bausch.
- sudeticum (Fk.) — 313. Vogesen: W. Ph. Schimper.

Rhabdoweisia Schpr.

- fugax (Hedw.) — 43. Sächs. Schweiz: L. R.

Rhynchostegium Schpr.

- confertum (Dicks.) — 842. Saubaudia: Paris.
- — — 906. England: Curnow.
- demissum (Wils.) — 341. Helv. Insubr.: Daldini.
- — — 541. Irland: Carrington.
- depressum (Bruch) — 796. England: Hunt et Curnow.
- — — 1090. Bonn: Dreesen.
- megapolitanum (Bland.) — 486. Sachsen: L. R.
- — — 1140. Bärwalde: Ruthe.
- — meridionale Sch. — 340. Marseille: W. Ph. Schimper.
- murale (Hedw.) — 293. Bodenseegegend: Jack.
- — — 384. Dublin (Irland): Moore.
- rotundifolium (Scop.) — 634. Braunsfels: Graf R. zu Solms-Laubach.
- ruscifolium (Neck.) — 385. Sachsen: L. R.
- rusciforme (Weis.) sub 385.
- — v. atlanticum Schpr. — 1091. Oberfranken: Arnold.
- — v. inundatum Br. et Sch. — 596. Sabaudia: Paris.
- — v. prolixum — 386. Württemberg: Kemmler.
- tenellum (Dicks.) — 383. Istrien: v. Tommasini.
- — — 542. Irland: Carrington.
- — — 904. Algier: Paris.
- — brevifolium Lindb. — 750. Schweden: Lindberg.

Schistidium Schpr.

- pulvinatum Brid. sub 319.

Schistostega Mohr.

- osmundacea W. et M. — 503. Thüringen: A. Röse; Sachsen: L. R.

Seligeria Br. et Sch.

- calcarea (Dicks.) — 28. Rügen; Laurer.
- pusilla (Hedw.) 572. Baiern: Arnold.
- — — 608. Baden: Jack et A. Geheeb.
- recurvata (Hedw.) 59. Grafschaft Glatz: Milde.
- — — 1158. Traunstein: Dr. Progel.

Sphaerangium Schpr.

- muticum (Schreb.) — 151. Thüringen: Lucas, Schliephacke; Breslau: Milde.
- triquetrum (Spruce) — 164. Baden: Bausch.
- — — 1054. Neumark: R. Ruthe.
- — — 1157. Wien: J. Juratzka.

Sphagnum Dill.

- acutifolium Ehrh. — 202 (formae: 203—204) Baden: Jack; Württemberg: Kemmler.
- — fuscum Sch. — 710. Lappland: A^ongström.
- — purpureum Sch. — 205. Sachsen: L. R.
- — c. fr. — 651. Schwarzwald: W. Ph. Schimper et Graf R. zu Solms.

Sphagnum Dill.

- acutifolium tenellum Sch. — 711. Lappland: A^ongström.
- auriculatum Schpr. — 713 (alia form. 714.).
- cuspidatum Ehrh. — 209. Württemberg: Kemmler; Baden: Jack.
- — plumosum Sch. — 717. Lappland: A^ongström.
- — — 211. Baden: Jack; Salzburg: Schwartz.
- — plumulosum Sch. — 211. c. Dänemark: Th. Jensen.
- — — 952. Westfalen: Wienkamp.
- — submersum Sch. — 210. Dänemark: Th. Jensen; Baden: Jack.
- cymbifolium Ehrh. — 207. Baden: Jack, Bausch.
- — (formae variae).
- — congestum Sch. 722. = Sph. rigidum var. compactum Schpr. Galizien: Schliephacke.
- fimbriatum Wils. — 201. Schlesien: Milde: Sachsen: L. R.
- — — 718. Lappland: A^ongström.
- Girgensohnii Russow — sub 801.
- insulosum A^ongstr. — 703. Lappland: A^ongström.
- laricinum Spruce — 712. Lappland: A^ongström.
- Lindbergii Schpr. — 301. Schlesien: Milde.
- — — 701. Lappland: A^ongström.
- molle Sull. — 556. Schweden: Lindberg.
- molluscoides C. Müller. — 1149. Baireuth: Molendo et Walther.
- molluscum Bruch — 213. Salzburg: Schwartz.
- — 1150. Baireuth: Molendo et Walther; b) England: W. Curnow; c) Bonn: P. Dreesen.
- — — 720. Lausitz: Breutel. d. Jütland: Th. Jensen.
- Mülleri Schpr. — 556. Schweden: S. O. Lindberg.
- pycnocladon A^ongstr. — 709. Lappland: A^ongström.
- recurvum P. Bv. — 708. Lappland: A^ongström.
- — — 1148. Fichtelgebirge: Walther et Molendo.
- rigidum Schpr. — 601. Schweden: S. O. Lindberg.
- — var. β . squarrosus Russ. — 1152. Bonn: P. Dreesen.
- riparium A^ongstr. — 707. Lappland: A^ongström.
- rubellum Wils. — 804. Oberpfalz: Arnold.
- — — 951. England: Wilson.
- squarrosus Pers. — 212. Sachsen: L. R.
- — squarrosulum Sch.
- — teres Sch. — 702. Lappland: A^ongström.
- strictum Lindb. — 1151. Finnland: S. O. Lindberg.
- subsecundum Nees — 208. Württemberg: Kemmler; Sachsen: L. R.
- — — 704. Lappland: A^ongström.
- — contortum Sch. — 302. Baden: Jack.
- — — 705. Lappland: A^ongström.
- — teres A^ongstr. — 1153. Schlesien: Limplicht.

Splachnum L.

- ampullaceum L. — 43. Neumark: Lasch; Schwerin: Fiedler.
- luteum L. — 728. Lappland: A^ongström.
- rubrum L. — 924. Lappland: A^ongström.
- sphacricum L. — 124. Norwegen: Graf R. zu Solms-Laubach.
- — ovatum — 814. Lappland: A^ongström.
- vasculosum L. — 256. Norwegen: Graf Solms.
- — — 729. Lapponia umens. A^ongström.

Sporledera Hampe.

- palustris (Br. et Sch.) — 502. Canton. Aargau: Geheeb.
- — — 956. Saarbrücken: Winter.

Stylostegium Br. et Sch.

- caespiticium Schwaegr. — 425. Kärnthen: Jack.

Syntrichia Brid. — Conf. Barbula.

- intermedia Brid. sub 1016
- mucronifolia Schultz sub 527.
- ruralis Brid. sub 225.
- subulata (L.) sub 224.

Systegium Schpr.

- crispum Hedw. — 30. Piemont: de Cesati.
- — — 653. Strassburg: Paris.

Tayloria Hook.

- Rudolphiana (Nees et H.) — 44. Ober-Baiern: Arnold.
- serrata (Hedw.) 45. Ober-Baiern: Bausch.
- — — 612. Bair. Alpen: Lorentz et Molendo.
- splachnoides (Schl.) — 925. Rhät-Alpen: Pfeffer.

Tetraphis Hedw.

- Browniana Brid. sub 657.
- pellucida (L.) 36. Sachsen: L. R.

Tetraplodon Br. et Sch.

- urceolatus Br. et Sch. 65. Kärnthen: Laurer.

Tetradontium Schwaegr.

- Brownii (Dicks) — 657. Sachsen: L. R.

Thamnum Schpr.

- alopecurum (L.) — 292. Baden: Bausch.
- — — 902. Sachsen: L. R.; Irland: Carrington.

Thuidium Schpr.

- abietinum (L.) 770. Württemberg: Weiss, Kemmler; England: W. Curnow.
- Blandowii (W. et M.) — 141. Schwerin: Wüstnei.
- decipiens de Ntris. — 1141. Südtirol: Venturi.
- — — 1182. Raxalpe: J. Juratzka.
- delicatulum (L.) — 7. Salzburg: Schwartz.
- — — 768. Lusatia super: Rostock.
- minutulum (Hedw.) 540. Baiern: Holler.
- punctulatum De Ntris — 769. Piemont: V. de Cesati.
- tamariscinum (Hedw.) — 20. Böhmen: Pf. Karl.

Timmia Hedw.

- megapolitana Hedw. — 66. Rügen: Laurer.
- — — 525. Carpathen: Kalchbrenner.
- bavarica Hasl. — 67. Fichtelgebirge: Laurer.
- Salisburgensis — 626. Salzburg: Sauter.
- norvegica Zett. — 1023. Dovre (Norwegen): Scheutz.

Tortula Hedw. — Conf. Barbula.

- intermedia — 1016. England: W. Curnow.
- lamellata Lindbg. sub 819.
- princeps De Ntris — 326. Ins. Sardinia: Gennari.
- — — 823. Gotland (Schweden): S. O. Lindberg.

Trematodon Rich.

- ambiguus (Hedw.) — 270. Christiana: Graf Solms; b) Essen (Niederlande): Buse.
- — — 410. Breslau: Milde.
- longicollis Michx. 1065. Ischia: Kiaer.

Trichodon Schpr.

- cylindricus (Hedw.) — 856. Sachsen: L. R.
- — — 948. Unter-Engadin: Killias.
- — — 962. Norwegen: Kiaer.

Trichostomum Hedw.

- anomalum Schpr. 461. Tirol: Milde.
- convolutum Brid. — 871. Tirol: Lohse et Milde.
- crispulum Bruch — 532. Oberfranken: Arnold.
- — angustifolium Br. et Sch. — 533. Salzburg: Sauter.
- flavipes De Ntris. — — sub 980. Barb. Brebissonii.
- glaucescens Hedw. sub 627.
- littorale Mitten — 1130. Cherbourg: Le Jolis.
- mutabile Bruch — 559. England: Curnow.
- — — 870. Istrien: v. Tommasini.
- — — 960. Westfalen: H. Müller.
- rigidulum (Dicks.) —
- — densum Sch. — 233. Schweiz: Hepp.
- — — 430. Sabaudia: Paris
- tophaceum Brid. — 558. Baireuth: Walther.
- — — 1131. Schweiz: Geheeb.
- tortile Schrad. — 46. Zweibrücken: Gumbel.

Ulota Mohr. — Conf. Orthotrichum.

- Bruchii Hsch. — 880. Saarbrücken: Ferd. Winter.
- calvescens Carr — 520. England: Carrington.
- crispa (Hedw.) 178. Baden: Bausch; Sachsen: L. R.
- — — 521. England: Carrington
- crispula Bruch — 179. Sachsen: L. R.; Böhmen: Siegmund, Pf. Karl.
- curvifolia (Wahl.) 182. Ordthal: Sauter.
- — — 222. Norwegen: Th. Jensen
- Drummondii (Grev.) — 881. Irland: D. Moore.
- Hutchinsiae (Sm. — 278. Canton Tessin: Killias.
- — — 879. Irland: D. Moore.
- Ludwigii (Brid.) — 519. Cant. Aargau: A. Geheeb.
- phyllantha (Brid.) 570. England: Curnow; Jütland: Th. Jensen.
- — — 949. Irland: W. Ph. Schimper.

Webera Hedw.

- albicans (Wahl.) — 361. Löbau in Preussen: v. Klinggräff.
- — — 1022. Norwegen: Scheutz.
- annotina Hedw. — 86. Greifswald: Laurer.
- — — 968. Jütland: Th. Jensen.
- earnea (L.) 236. Salzburg: Schwartz.
- — — 441. Aschaffenburg: Geyer.
- cruda (Schreb.) — 1024. Neumark (Preussen): Ruthe.
- cucullata (Hedw.)
- — f. gracilentia Sch. — Norwegen: Th. Jensen.
- elongata Schw. — 275. Carpathen: Kalchbrenner.
- — — 360. Piemont: de Cesati.
- longicolla (Hedw.) — 359. Tirol: Jack.
- — — 873. Mt. Gemmi: Jack.

chera Hedw.

- Ludwigii (Spr.)
 — — — gracilis Schpr. — 237. Berner Oberland:
 Hepp.
 — nutans (Schr.) — 272. Carpathen: Kalkbrenner.
 — — — 329. Holstein: Gottsche.
 — — longiseta Schpr. — 585. Galizien: Schliephacke.
 — — strangulata Schpr. — 838. Westfalen: H. Müller.
 — Tozeri (Grev.) — 581. England: W. Curnow.

oitia Hornsch.

- nivalis Hsch. — 367. Salzburg: Göppert.

Weisia Hedw.

- cirrhata Hedw. — 106. Arnheim: Buse.
 — — — 366. Baden: Bausch.
 — — — 808. England: Curnow.
 — crispula Hedw. — 793. Galizien: Rehmann.
 — fugax Hedw. 33. Sachsen: L. R.
 — mucronata Bruch — 607. Saarbrücken: Ferd.
 Winter.
 — recurvata Brid. sub 171.

Weisia Hedw.

- serrulata Funk — 1057. Schweiz: Pfeffer.
 — viridula Brid. — 169. Baden: Bausch: Wetzlar:
 Graf R. zu Solms-Laubach.
 — — — 354. Istrien: v. Tommasini.
 — — — 794. England: Curnow.
 — — densifolia Schpr. — 795. Westfalen: H. Müller.
 — — gymnostomoides Sch. — 170. Wetzlar: Graf
 R. zu Solms-Laubach.
 — — stenocarpa Nees — 355. Wetzlar: Graf R.
 zu Solms-Laubach.
 — Wimmeriana (Seudtn.) — 453. Heiligenblut:
 Lorentz.

Zygodon Hook. et Tayl.

- 15! — Forsteri (Dicks) — 882. Bonn: P. Dreesen.
 — gracilis Wils. — 1080. Lancashire: Hunt.
 — torquatus Liebm. — 277. Norwegen: Jensen.
 — viridissimus (Dicks.) — 524. Irland: Carrington.
 — — — 626. Tirol: Molendo.



